



कापूस हंगाम २०२३ – २४: साप्ताहिक पीक सक्ती
(कालावधी २२ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट २०२३)

महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	मागील आठवड्यातील खूप पाऊस (मिमी)					पडणाऱ्या पावसाचा अंदाज (मिमी)				
		ऑगस्ट					ऑगस्ट				
		१८	१९	२०	२१	२२	२४	२५	२६	२७	२८
	धुळे	0	0	1.5	10.5	0	6	5	8	9	8
	नंदुरबार	0.5	0	0	2.5	0	6	3	5	6	6
	जळगाव	0	9	0	0	0	10	7	8	10	9
	अहमदनगर	0	3	1	0	0	9	6	7	7	7
	औरंगाबाद	0	10	2	0	0	12	8	8	5	5
	जालना						10	6	5	7	5
	बीड	0	0.4	0	0	0	1	3	6	3	4
	नांदेड	0	19	0	0	0	3	2	2	6	7
	परभणी	0	7	2.8	0.3	0	9	4	2	2	4
	हिंगोली	0	16	13.5	7	0	7	4	2	4	6
	बुलढाणा	0	0	22	0	0	7.7	1.2	8.9	4.9	6
	अकोला	0	6.5	9.9	0.1	0	12	3.2	9.2	10	11
	वाशीम	0	0	5	4	0	12	2.4	7.2	6.6	10
	अमरावती	4.2	8.6	1.4	4.8	0	13	4.9	6.3	7.7	8
	यवतमाळ	1.1	18	0	1	0	9.7	8.5	6.8	9.5	8
	वर्धा	0	44	11	0	0	9.6	2	9.2	8.7	6
	नागपूर	38.7	14	0.6	0	0	8.7	13	12	6.1	9
	चंद्रपूर	9	58	0	0	0	11	11	9.5	11	10
पावसाचे प्रमाण आणि रंग कोड		0.1 to 2.4 mm		2.5 to 15.5 mm		15.6 to 64.4 mm		64.5 to 115.5 mm		115.6 to 204.4	
पावसाची प्रेणी		खूप हलका पाऊस		तुरळक पाऊस		मध्यम प्रचण्ड पाऊस		मुसळधार पाऊस		अति मुसळधार पाऊस	

पीक परिस्थिती:

अकोला:

- पेरणी केलेले पीक ४७ ते ५४ दिवसांचे असून चौरस प्रामाणी अवस्थेत आहे.
- डवरा चालवणे, तण काढणे, खत टाकणे आणि काटकनाशक फवारण्या सुद्धा आहे.
- उश्न पेरणी केलेल्या कपाशीवर तणांचा प्रदुबाव जाणवत आहे.
- काट आणि रोगांचा प्रदुबाव नाही परंतु रसशोषक काटकांचा प्रदुबाव उश्न पेरणी केलेल्या कपाशीमध्ये आर्थक नुकसान पातळी खाली आहे.
- रोगांचा प्रदुबाव नाही

नांदेड:

- प्रक ४० ते ६० दिवसांचे असून शाख्य वाढ ते चौरस प्रामाणी अवस्थेत आहे.
- काट व रोगांचा प्रदुबाव नाही परंतु फुल फुडे व तुडतुड्यांचा प्रदुबाव असून तो आर्थक नुकसान पातळी खाली आहे.

राहुर

- पीक ५५ ते ८० ढवसांचे असून ढवसांचे असून शाख्य वाढ ते फुले येण्याया अवथेत आहे.
- डवरा चालवणे, तण काढणे सु आहे.
- रस शोषक काटकांचा ादुभाब आधक नुकसान पातळी वर आहे.
- हरयाल पाथनयम इयाद तणांचा शेतात ादुभाब आढळला आहे.
- मायलोसेरस भुंयामुळे कापसाचे नुकसान झाले आहे.

पीक सला:

अकोला येथे, गेया आठवयात या भागात अतवृट झाल या भागातील कपाशीया शेतातील अतत पाणी काढून टाकयाचा सला शेतक्यांना देयात आला आहे. ओलावा संवधनासाठी ५० ते ५५ डीएस दराने कापूस शेतात नयमत अंतराने कुदळा या टायनाला दोर बांधून नांगरयाचा सला दला जातो. कापसात डवरा चालवणे आणि तण काढणे यासार या आंतरमशागती या या कराया. बागायती संकत बीट कापसासाठी ९० क्लो न/हेटरचे दुसरे वभाजन करावे. फुलो याया अवथेत २% न आणि बड वकासाया अवथेत २% डी ए पी ची फवारणी करावी. कापसाची पाती आणि फुले नैसगिकरया कमी होऊ नयेत यासाठी एन ए ए ४.५ एसएल @ ४ मल/१० लटर आणि कापसाची अतत शाखीय वाढ रोखयासाठी लोरमेवॅट लोराईड @ १० मल/१० लटर पायात फवारणी करावी. गुलाबी बडअळीचे नरण करयासाठी कामगंध सापळे @ ५/हेटर लावा. गुलाबी बडअळीची अंडी घालणे आणि शोषक काटकांचे नयण रोखयासाठी कडुनंब आधात काटकनाशकांची जसे क अझाडराटन ३०० पीपीएम @ १०० मल/क्वा १५०० पीपीएम @ ५० मल/क्वा ३००० पीपीएम ४० मल/१० लटर पायात फवारणी सु करावी. कपाशीमये पॅरावॉटची लणे आढळयास, बाधत झाडे कॉपर ऑसिलोराईड ५० डयूपी @ ३० म/क्वा काबडाझम ५० डयूपी @ ४ म + न १५० म १० लटर पायात मसळून ४८ तासांया आत रोगात झाडांया मुळांशी यावे.

नांदेड येथे, शेतक्यांना ६० डीएस दराने संचन केले या वकासात ६० क्लो न त हेटर टॉप पेंसंग देयाचा सला देयात आला आहे. फुलक यांची सं या नयत करयासाठी ८ ते १० मवळे घकट सापळे/एकर आणि नळे घकट सापळे ८-१०/एकर लावावे. रसशोषक कड रोखयासाठी आणि कापसावर गुलाबी बडअळी अंडी घालू नयेत ाहणून नंबोळीअक ५% क्वा कडुनंब तेल @ १ लटर/एकर फवारणी करावी. गुलाबी बडअळीया पतंगाया याकलापांवर ल ठेवयासाठी कामगंध सापळे @ ५ सापळे/हेटर थामत करावे. डोमकया गोळा कन नट कराया. रसशोषक कड आधक नुकसान पातळी ओलांडयास लॉनकॅमड ५० डयूपी @ ४ म/क्वा बुोफेझन २५ एससी @ २० मल/क्वा डायफाथयुरॉन ५० डयूपी @ १२ म/१० लटर पायात मसळून फवारणी करावी.

राहुर येथे शेतक्यांना आवयकता असयास वेळेवर आंतरमशागतीची कामे करयाचा सला दला जातो. ओया मातीया थित, जेथे हाताने तण काढणे शय नाह तेथे जर शेतात ामुयाने गवताळ तणांचा ादुभाब झाला असेल तर उगवयानंतर २५-३० डीएस ामाणे विझालोफॉप इथाइल ५% ईसी @ २ मल/लटर पाणी, आणि ंद पाने असलेया तणांचा ादुभाब झाला असेल तर पायरथोबॅक सोडयम १०% ईसी @ १.२५ मल/लटर पाणी तणनाशकांचा वापर करावा. क्वा पायरथोबॅक सोडयम ६% ईसी + विझालॉफॉप इथाइल ४% ईसी @ २-२.५ मल/लटर पाणी गवताळ आणि ंद-पालदार तणांया नयणासाठी वापर करावा. मवळे घकट सापळे @ ८ /एकर आणि नळे घकट सापळे @ ८/एकर फुलक यांया नरणे यासाठी थामत करावे. रस शोषक काटकांचे नरण करयासाठी व गुलाबी बडअळी अंडी घालू नयेत ाहणून नंबोळीअक ५% ईसी क्वा कडुनंब तेल @ १ लटर/एकर फवारयाचा सला दला जातो. गुलाबी बडअळीया पतंगाया याकलापांवर ल ठेवयासाठी कामगंध

सापळे @ ५ सापळे/हेक्टर र्थाप्त करावे. डोमकया गोळा कण व्वात नट करा. रस शोषक काटक आथक नुकसान पातळी ओलांडयास लॉकॅड ५० ड्युजी @ ४ ाँम व्वा बुपेडिन २५ एस सी @ २० ाँम व्वा डायफेथयुरॉन ५० ड्युपी @ १२०म/ १० लटर पायात ासळून फवारणी करावी. पानावरल बुरशीजय ठपके आण बुरशीजय बड सड रोगांचे यवथापन करयासाठ काबडाझम ५० ड्युपी @0.04% व्वा काबडाझम १२%+मॅकोझेब ६३% ड्युपी @०.३% व्वा पेसोसिम-मथाइल ४४ .३ एस सी @ ०.१% व्वा पोमनेब ७० ड्युपी @ ०.२५% व्वा पोमकोनाझोल २५ ईसी@ ०.१% व्वा मेट्राम ५५ % + पायरालोपोन्न ५ % ड्युजी @०.२% व्वा अझॉसीपोन्न १८ .२ % ड्यु/ड्यु +डायफेनोकोनाझोल ११ .४ % ड्यु/ड्यु एस सी @०.१% व्वा लूसापायरॉसाड १६७ ाँम/लटर+ पायरालोपोन्न ३३३ ाँम/लटर एस सी @ ०.६% पायात फवारणी करावी.

The detailed information regarding cotton production technology, e.g. selection of soil, varieties, fertilizer application, sowing methods, irrigation systems, management of weeds, insect pests and diseases, etc. can be availed from an android based **CICR Cotton App** developed by ICAR-CICR, Nagpur. The app can be downloaded free of cost from Google play store. Additionally, the crop growth stage specific and weather based weekly advisory are uploaded on the website of ICAR-CICR also to be consulted for the benefit of farmers