


**ଭା.କୃ.ଅ.ନୁ.ପ.- କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କପା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ନାଗପୁର
କପା ଚାଷ ପାଇଁ XVIII(ଅଷ୍ଟଦଶ) ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ**

ODISHA		ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ବାସ୍ତବିକ ବର୍ଷା (ମିମି)					ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ଷା (ମିମି)				
		ସେପ୍ଟେମ୍ବର					ସେପ୍ଟେମ୍ବର				
		15	16	17	18	19	21	22	23	24	25
	କୋରାପୁଟ	3.8	0	0	3.3	0	15	10	10	15	25
	କଳାହାଣ୍ଡି	20.4	0	0	0	0	15	10	5	15	20
	ବଲାଙ୍ଗିର	0	0	0	0	0	20	10	5	5	10
ବର୍ଷ ପରିମାଣ ଓ ରଙ୍ଗ ସଂକେତ		୦.୧ ରୁ ୨.୪ ମି ମି		୨.୫ ରୁ ୧୫.୫ ମିମି		୧୫.୬ ରୁ ୨୪.୪ ମିମି		୨୪.୫ ରୁ ୧୧୫.୫ ମିମି		୧୧୫.୬ ରୁ ୨୦୪.୪ ମିମି	
ବର୍ଷା ପ୍ରକାର		ଅତି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା		ସାଧାରଣ ବର୍ଷା		ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା		ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା	

କପା ଫସଲ ଅବସ୍ଥା:

ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଫସଲ 80 ରୁ 90 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଫୁଲ ଓ ବକରା ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କପା ଫସଲ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘାସ ବଛା, କୋଡାଖୋସା, ଘାସମରା ଔଷଧର ପ୍ରୟୋଗ, ଲେଡା ପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ପତ୍ରଖୁଆ ଆଦି ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କରିଛନ୍ତି । କପାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ପତ୍ରଖୁଆ ପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ, ଲେଡା ପୋକ ଓ ଅଣବିଟି କପା ଫସଲରେ ଆମେରିକୀୟ ବକରାବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଲାଗି ରହି ଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର କେତକ ସ୍ଥାନରୁ ଝଉଁଳା, ମୂଳ ଶିଢା ଓ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ପରାମର୍ଶ:

କପା ଫସଲ 80 90 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ କପା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 1 ମିଟର ହେଲେ କିମ୍ବା ଫସଲ 90 ଦିନର ହେଲେ ଗଛର ଅଗ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । କପା ଫସଲରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗୋ ଓ ପୋକର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଖୁଆ ଓ ଜଉ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦାହେଳି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ୫୦ WG କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଡାଇନେଟୋଫ୍ଲୁରା 20 SG କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ଆଇମିନୋଥୋକ୍ସାମ 25 WG ଅଭିଷେଧକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଖୁଆ ପୋକ ଓ ଧଳାମାଛି ପୋକର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ । ପତଳ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୫ ମିଲି କ୍ଲୋରୋପାଇରୋଫୋସ 20 EC କିମ୍ବା ୨୦ ମିଲି କ୍ଲୁଜନାଲଫୋସ 20 AF କିମ୍ବା ୩୦ ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ 50 EC ଉଭୟକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଣ ବିଟି କପା ଚାଷ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକୀୟ ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ଗ୍ରାମ ଏମାମେକଟୀନ ବେଞ୍ଜିଓକ୍ସିଲ କିମ୍ବା 20 ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫୋସ କୀଟନାଶକ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ନାଲି ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ ମଗ୍ନେସିଅମ ସଲ୍ଫେଟ୍ ସହିତ 100 ଗ୍ରାମ ମୁରିଆ ସାର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କପା ଫସଲରେ ପାରା ଓଁଲୁ କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ଝଉଁଳା ରୋଗୋ ଲାଗିଲେ 24-48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ କୋବାଲ୍ଟ କ୍ଲୋରାଇଡ ମିଶାଇ 1 ଏକର ଜମିରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହା ପରେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2.5 ଗ୍ରାମ କପର ଆକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ 200 ଗ୍ରାମ ମୁରିଆ ସାର ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୂଳ ଶିଢା ଓ ଝଉଁଳା ରୋଗ ଲାଗିଲେ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 12 ଗ୍ରାମ କର୍ବେନ୍‌ଜିମ 50 WP କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଭିରିଦେ କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ହେର୍ଜିଅନୁମ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 25-30 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସି କ୍ଲୋରାଇଡ 50 WP ଔଷଧ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉନ୍ନତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥା ମୃତ୍ତିକା ଓ ବିହନ ଚୟନ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ , ବୁଣିବା ପଦ୍ଧତି, ଜଳସେଚନ ଓ ଘାସ ପରିଚାଳନା, ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟୋଏଡ ଆଧାରିତ ସିଆଇସିଆର କଟନ ଆପ (CICR Cotton App) ଯାହାକି ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର, ନାଗପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ରୁ ମିଳି ପାରିବ । ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରୁ ଏହି ଆପ କୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ କରା ଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଛଡା ଫସଲର ଅବସ୍ଥା ଓ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ ସାପ୍ତାହିକ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇସିଏଆର-ସିଆଇସିଆର ୱେବ ସାଇଟ ରେ ଅପଲୋଡ କରା ଯାଉଛି, ଯାହାସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ପାରିବ ।